



PACKAGING

Disponibile in confezioni da 1 e 20 kg.

COMPOSIZIONE

Copolimeri insolubili di polivinilimidazolo e polivinilpirrolidone (PVI/PVP).

Si dichiara che CX PVI PVP:

- non contiene OGM in accordo al Regolamento (CE) 1829/2003 e 1830/2003
- non contiene allergeni (allegato II del Regolamento UE 1169/2011)

PERICOLOSITÀ

In base alla normativa europea vigente il prodotto è classificato: non pericoloso.

Scheda tecnica del 24.08.2026

CARATTERISTICHE

COPOLIMERI ADSORBENTI DI POLIVINILIMIDAZOLO/POLIVINILPIROLIDONE

CX PVI PVP presenta un'elevata purezza ed è di consistenza impalpabile; la sua addizione permette la riduzione di metalli pesanti, in particolare rame e ferro, grazie all'elevata e specifica capacità di adsorbimento; oltre che sostanze fenoliche specialmente quelle a carattere tannico e maggiormente ossidate.

Nel trattamento dei vini bianchi e rosati il CX PVI PVP porta ad una sensibile diminuzione degli acidi idrossicinnamici responsabili dell'imbrunimento dei vini. Risulta performante anche per la prevenzione dell'alterazione fenolica denominata pinking.

Nel trattamento dei vini rossi, di contro, porta ad una minima diminuzione del colore rosso, mentre la capacità di adsorbire i metalli rimane pressoché invariata.

Il pH ideale in cui esplica al meglio la sua capacità adsorbente è circa 3,4. A pH superiori di 3,5 la capacità adsorbente può decrescere fino al 10%.

IMPIEGHI

Per le sue caratteristiche CX PVI PVP è consigliato nel trattamento di vini e mosti per abbassare il contenuto in metalli e per prevenire gli effetti delle ossidazioni a carico delle sostanze fenoliche. Si consiglia di eseguire test preventivi di laboratorio.

Per l'impiego di CX PVI PVP attenersi alle norme di legge vigenti in materia.



MODALITÀ D'USO

Disperdere CX PVI PVP in acqua con rapporto 1:10, mantenere in agitazione per almeno 30 minuti e quindi aggiungere alla massa da trattare mantenendo in sospensione il più possibile per ottimizzare l'adsorbimento dei metalli indesiderati. Il prodotto va eliminato per filtrazione entro due giorni dall'inizio del trattamento.

DOSI

Da 20 a 50 g/hL (limite di legge europeo).

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco ed asciutto. Richiudere accuratamente le confezioni aperte.